

L'avis de Roselyne HINSINGER,
adjointe au Maire de l'Aiguillon-sur-Mer

Pourquoi la municipalité de l'Aiguillon-sur-mer s'est-t-elle investie dans la protection du Gravelot à collier interrompu ?

La municipalité de l'Aiguillon-sur-Mer se soucie particulièrement de la préservation de la faune et de la flore de sa commune. Le Gravelot à collier interrompu est gage d'un littoral naturel de qualité. C'est donc tout naturellement que notre collectivité est sensibilisée et s'investit dans ce domaine.

Quels sont les moyens mis en œuvre pour la protection de ces oiseaux ?

La participation à la mise en place d'enclos est une première action. De plus, la commune ne nettoie pas les laisses de mer, lieux où l'espèce niche et se nourrit. D'une manière générale, la municipalité ne nettoie pas les hauts de plage pour éviter toutes dégradations de dune.



AILLEURS DANS LE MONDE ...

Le Gravelot à collier interrompu hiverne sur le littoral méditerranéen et nord africain (de l'Egypte à la Mauritanie).

On le retrouve aussi en Asie Centrale jusqu'en Chine et au Japon, et traverse l'Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Enfin, il existe quatre autres sous-espèces, présentes sur la côte Est-Pacifique et sur le littoral américain.

POUR EN SAVOIR PLUS

Réserve Naturelle de la Baie de l'Aiguillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Ligue pour la Protection des Oiseaux

Ferme de la Prée Mizottière
85450 Sainte-Radegonde des Noyers
tél. 02 51 56 82 98 - fax 02 51 56 87 94

Le Gravelot à collier interrompu

► Charadrius alexandrinus ◀◀

Imprimé sur papier recyclé



BIBLIOGRAPHIE TECHNIQUE

The Birds of the Western Palearctic
(D.W. Snow & C.M. Perrins)

Handbook of the birds of Europe
(Cramps et Simmons)

Financeurs :



Ce document a été réalisé en partenariat avec :



Credit photos : Remy BEGUART / Conception graphique : REFLEX (1 / 06)

ÉCOLOGIE

Le Gravelot à collier interrompu est un petit limicole dont la taille varie entre 15 et 17 cm. Son envergure est de 34 cm. Son poids est compris entre 32 et 53 g. Son bec et ses pattes sont de couleur noire.



Une barre blanche à l'aile et sur un côté de la queue permettent de l'identifier en vol. Lors de la période de reproduction, le mâle a une calotte très visible avec des nuances de couleur rouille. La femelle, quant à elle, porte des marques grises et brunâtres sur la tête et les côtés de la poitrine.

Les deux adultes (mâle et femelle) ont une bande noire incomplète autour du cou. C'est d'ailleurs cet élément physique qui est à l'origine du nom vernaculaire de l'espèce.

Oeufs dans un nid

Poussin immobile et camouflé dans le sable



L'alimentation du Gravelot à collier interrompu est principalement composée de petits insectes mais aussi de petits crustacés, de vers marins et de mollusques. Ce limicole se nourrit principalement dans les laisses de mer ou les zones intertidales.

Les Gravelots à collier interrompu vivent, en effet, sur les hauts de plage où l'on retrouve les laisses de mer. Elles sont constituées essentiellement de débris végétaux poussés par le flot des plus fortes marées et laissés sur place.

Le nid est généralement disposé dans les laisses de mer et contient 2 à 3 œufs. Il peut être aussi localisé dans des zones à sable grossier et à débris coquilliers. Le Gravelot couve entre 24 et 27 jours et les jeunes s'envolent entre 27 et 41 jours après l'écllosion des œufs.

RÉPARTITION ET STATUT EN EUROPE

Ce limicole se retrouve partout en Europe, de la Scandinavie aux pays riverains de la Méditerranée et de la Mer Noire.

En France, le Gravelot à collier interrompu niche sur les polders, les marais salants et surtout sur les plages sableuses et les dunes. En 1996, la population nicheuse était inférieure à 1500 couples.

Le Gravelot à collier interrompu est une espèce en déclin général qui se raréfie dans le nord de l'Europe.

IL EST PROTÉGÉ PAR LA LOI.


En Vendée, le Gravelot à collier interrompu niche sur le littoral, de Noirmoutier à la pointe de l'Aiguillon. Trois secteurs semblent privilégiés par l'espèce pour sa reproduction.

Ces trois sites sont :

- 1. Le nord de la Vendée :**
Noirmoutier et le littoral du Marais Breton
- 2. Le centre de la Vendée :** le littoral du Pays d'Olonne
- 3. Le sud :** tout le littoral de Longeville-sur-mer à l'Aiguillon-sur-mer.



Les zones de nidification dans le Marais poitevin :



LES MENACES QUI PÈSENT SUR LE GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU

- Destruction de son milieu de vie
- Nettoyage des plages
- Perturbation due cycle de reproduction
- Destruction des nids due aux activités balnéaires
- Dérangement des adultes en période de reproduction
- Milieux favorables à la reproduction de moins en moins fréquents



Adulte feignant d'être blessé pour éloigner les prédateurs de son nid